Тренировочная работа №2 по МАТЕМАТИКЕ

25 января 2012 года

11 класс

Вариант 1

Район _____

Город (населенный пункт). _____

Школа. _____

Класс _____

Фамилия _____

Имя. _____

Отчество _____

© МИОО, 2012 г.

© МИОО, 2012 г.

Часть 1

B1 Железнодорожный билет для взрослого стоит 640 рублей. Стоимость билета для школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 16 школьников и 3 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу?

Ответ:

B2 На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во все дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни месяца, по вертикали – количество посетителей сайта за данный день. 1 ноября 2009 года – воскресенье. Определите по диаграмме, какое наименьшее число посетителей было за данный период по средам?



Ответ:

© МИОО, 2012 г.

B3 Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



Ответ:

B4 Строительной фирме нужно приобрести 40 кубометров строительного бруса у одного из трех поставщиков. Какова наименьшая стоимость такой покупки с доставкой (в рублях)? Цены и условия доставки приведены в таблице.

Поставщик	Цена бруса (за 1 м^3)	Стоимость доставки	Дополнительные условия
А	3700 руб.	9900 руб.	
Б	4000 руб.	7900 руб.	При заказе на сумму больше 150000 руб. доставка бесплатно
В	3800 руб.	7900 руб.	При заказе на сумму больше 200000 руб. доставка бесплатно

Ответ:

B5 Найдите сумму корней уравнения $\frac{x+5}{2x+5} = \frac{x+5}{x-7}$.

Ответ:

© МИОО, 2012 г.

B6 В треугольнике ABC угол A равен 69°, а углы B и C острые. BD и CE – высоты, пересекающиеся в точке O. Найдите угол DOE. Ответ дайте в градусах.



Ответ:

B7 Найдите $5\cos\left(\frac{5\pi}{2}+\alpha\right)$, если $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$ и $\alpha\in\left(\pi;\ \frac{3\pi}{2}\right)$.

Ответ:

B8 На рисунке изображены график функции $y=f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ:

© МИОО, 2012 г.

B9 В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ известно, что $CC_1=6$, $CD=17$, $AD=6$. Найдите длину диагонали CA_1.



Ответ:

B10 В среднем из 2000 садовых насосов, поступивших в продажу, 10 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ:

B11

Дана правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, площадь основания которой равна 6, а боковое ребро равно 8. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, A_1, C_1.



Ответ:

© МИОО, 2012 г.

B12 Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени для нагревательного элемента некоторого прибора была получена экспериментально. На исследуемом интервале температура вычисляется по формуле $T(t) = T_0 + bt + at^2$, где t — время в минутах, $T_0 = 1380$ К, $a = -15$ К / мин^2, $b = 165$ К / мин. Известно, что при температуре нагревателя свыше 1800 К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключить. Определите, через какое наибольшее время после начала работы нужно отключить прибор. Ответ выразите в минутах.

Ответ:

B13 Из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 54 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью, на 36 км/ч большей скорости первого, в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

B14 Найдите точку максимума функции $y = (x+5)^2(x-7)$.

Ответ:

© МИОО, 2012 г.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания С1–С4 используйте бланк ответов №2. Запишите сначала номер выполняемого задания, а затем полное обоснованное решение и ответ.

C1 а) Решите уравнение $\sin^2\frac{x}{2} - \cos^2\frac{x}{2} = \cos 2x$.

б) Найдите корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\frac{\pi}{2};\ 2\pi\right]$.

C2 Дана правильная четырехугольная пирамида $SABCD$. Боковое ребро $SA = \sqrt{5}$, сторона основания равна 2. Найдите расстояние от точки B до плоскости ADM, где M – середина ребра SC.

C3 Решите систему

$$\begin{cases} 3^{4x-1} + 3^{4x+1} \geq 80, \\ \log_{\frac{x}{2}}\left(4x^2 - 3x + 1\right) \geq 0. \end{cases}$$

C4 Дан треугольник ABC со сторонами $AB = 15$, $AC = 9$ и $BC = 12$. На стороне BC взята точка D, а на отрезке AD – точка O, причем $CD = 4$ и $AO = 3OD$. Окружность с центром O проходит через точку C. Найдите расстояние от точки C до точки пересечения этой окружности с прямой AB.

© МИОО, 2012 г.

Тренировочная работа №2 по МАТЕМАТИКЕ

25 января 2012 года

11 класс

Вариант 2

Район

Город (населенный пункт).

Школа.

Класс

Фамилия

Имя.

Отчество

© МИОО, 2012 г.

Инструкция по выполнению работы.

На выполнение экзаменационной работы по математике дается 4 часа (240 мин). Работа состоит из двух частей и содержит 20 заданий.

Часть 1 содержит 14 заданий с кратким ответом (B1–B14.) базового уровня по материалу курса математики Задания части 1 считаются выполненными, если экзаменуемый дал верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби

Часть 2 содержит 4 более сложных заданий (C1–C4.) по материалу курса математики При их выполнении надо записать полное решение и записать ответ.

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается выполнить сразу, и переходить к следующему К выполнению пропущенных заданий можно вернуться, если у вас останется время

Желаем успеха!.

© МИОО, 2012 г.

Часть 1

B1 Железнодорожный билет для взрослого стоит 670 рублей. Стоимость билета для школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 19 школьников и 3 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу?

Ответ:

B2 На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости за каждый час в течение суток 8 декабря 2009 года. По горизонтали указывается номер часа, по вертикали — количество посетителей. Определите по диаграмме, в течение какого часа суток возникает пиковая нагрузка на сайт (наибольшее число посетителей)?



Ответ:

© МИОО, 2012 г.

B3 Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



Ответ:

B4 Строительной фирме нужно приобрести 40 кубометров строительного бруса у одного из трех поставщиков. Какова наименьшая стоимость такой покупки с доставкой (в рублях)? Цены и условия доставки приведены в таблице.

Поставщик	Цена бруса (за 1 м^3)	Стоимость доставки	Дополнительные условия
А	4100 руб.	9700 руб.	
Б	4300 руб.	7700 руб.	При заказе на сумму больше 150000 руб. доставка бесплатно
В	4200 руб.	7700 руб.	При заказе на сумму больше 200000 руб. доставка бесплатно

Ответ:

B5 Найдите сумму корней уравнения $\frac{x+3}{3x+7} = \frac{x+3}{x+5}$.

Ответ:

© МИОО, 2012 г.

B6 В треугольнике ABC угол A равен 6°, а углы B и C острые. BD и CE – высоты, пересекающиеся в точке O. Найдите угол DOE. Ответ дайте в градусах.



Ответ:

B7 Найдите $-13\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$, если $\cos\alpha=\frac{12}{13}$ и $\alpha\in\left(\frac{3\pi}{2};\ 2\pi\right)$.

Ответ:

B8 На рисунке изображены график функции $y=f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ:

© МИОО, 2012 г.

B9 В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ известно, что $DD_1=14$, $CD=12$, $AD=12$. Найдите длину диагонали BD_1.



Ответ:

B10 В среднем из 1100 садовых насосов, поступивших в продажу, 11 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ:

B11 Дана правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, площадь основания которой равна 4, а боковое ребро равно 6. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки A, C, A_1, B_1, C_1.



Ответ:

© МИОО, 2012 г.

B12 Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени для нагревательного элемента некоторого прибора была получена экспериментально. На исследуемом интервале температура вычисляется по формуле $T(t) = T_0 + bt + at^2$, где t — время в минутах, $T_0 = 1330$ К, $a = -15$ К / мин^2, $b = 165$ К / мин. Известно, что при температуре нагревателя свыше 1600 К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключить. Определите, через какое наибольшее время после начала работы нужно отключить прибор. Ответ выразите в минутах.

Ответ:

B13 Из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 34 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью, на 51 км/ч большей скорости первого, в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

B14 Найдите точку максимума функции $y = (x+7)^2 x + 10$.

Ответ:

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания C1–C4 используйте бланк ответов №2. Запишите сначала номер выполняемого задания, а затем полное обоснованное решение и ответ.

C1 а) Решите уравнение $\cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$.

б) Найдите корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\pi;\ \frac{5\pi}{2}\right]$.

C2 Дана правильная четырехугольная пирамида $SABCD$. Боковое ребро $SA = \sqrt{5}$, сторона основания равна 2. Найдите расстояние от точки S до плоскости ADM, где M – середина ребра SC.

© МИОО, 2012 г.

C3 Решите систему

$$\begin{cases} 5^{3x-1} - 5^{3x+1} \le -72, \\ \log_{\frac{x}{3}}\left(3x^2 - 2x + 1\right) \ge 0. \end{cases}$$

C4 Дан треугольник ABC со сторонами $AB = 25$, $AC = 7$ и $BC = 24$. На стороне BC взята точка D, а на отрезке AD – точка O, причем $CD = 8$ и $AO = 3OD$. Окружность с центром O проходит через точку C. Найдите расстояние от точки C до точки пересечения этой окружности с прямой AB.

© МИОО, 2012 г.

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

С1 а) Решите уравнение $\sin^2\frac{x}{2} - \cos^2\frac{x}{2} = \cos 2x$.

б) Найдите корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\frac{\pi}{2};\ 2\pi\right]$.

Преобразуем уравнение:

$$-\cos x = \cos 2x;$$

$$\cos(x+\pi) = \cos 2x.$$

Значит, $x+\pi = 2x + 2\pi k$ или $x+\pi = -2x + 2\pi k$, где $k \in Z$.

В первом случае $x = \pi + 2\pi k$, во втором случае $x = -\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3}$, где $k \in \mathbb{Z}$.

Первая серия решений входит во вторую.



б) Отметим решения на тригонометрической окружности.

Отрезку $\left[\frac{\pi}{2};\ 2\pi\right]$ принадлежат корни π и $\frac{5\pi}{3}$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3}$, $k \in Z$; б) π; $\frac{5\pi}{3}$.

Содержание критерия	Баллы
Уравнение решено верно, указаны все корни, принадлежащие интервалу	2
Уравнение решено верно, однако корни, принадлежащие интервалу, не указаны или указаны неверно	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© МИОО, 2012 г.

С2 Дана правильная четырехугольная пирамида $SABCD$. Боковое ребро $SA = \sqrt{5}$, сторона основания равна 2. Найдите расстояние от точки B до плоскости ADM, где M – середина ребра SC.

Построим сечение $ADMK$, K – середина ребра SB. Прямая BC параллельна AD, значит, искомое расстояние равно расстоянию от точки N до плоскости ADM, где N – середина BC. Пусть P – середина AD. Рассмотрим сечение NSP.



$$SN = SP = \sqrt{SA^2 - AP^2} = \sqrt{5-1} = 2$$

.

Значит, треугольник SNP равносторонний. Искомое расстояние равно расстоянию от N до PQ, где Q – середина SN, PQ – медиана и высота $\triangle SNP$.

Поэтому искомое расстояние равно $NQ = \frac{1}{2}SN = 1$.

Ответ: 1.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Решение содержит обоснованный переход к планиметрической задаче, но получен неверный ответ или решение не закончено	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© МИОО, 2012 г.

C3 Решите систему

$$\begin{cases} 3^{4x-1}+3^{4x+1}\geq 80, \\ \log_{\frac{x}{2}}\left(4x^2-3x+1\right)\geq 0. \end{cases}$$

1. Решим первое неравенство:

$$3^{4x-1}(1+9)\geq 80;\ 3^{4x-1}\geq 8;\quad 4x-1\geq \log_3 8;\quad x\geq \frac{\log_3 8+1}{4}.$$

2. Решим второе неравенство $4x^2-3x+1>0$ при всех x. При условиях $x>0$ и $x\neq 2$ получаем неравенство

$$\left(\frac{x}{2}-1\right)\left(4x^2-3x+1-1\right)\geq 0;$$

$$x(x-2)(4x-3)\geq 0.$$

При указанных условиях получаем: $0<x\leq\frac{3}{4}$ или $x>2$.

3. Решением системы является общая часть решений двух неравенств. $1<\log_3 8<2$, поэтому $1<\frac{\log_3 8+1}{4}<\frac{3}{4}$. Следовательно,

$$\frac{\log_3 8+1}{4}\leq x\leq\frac{3}{4}\text{ или }x>2.$$

Ответ: $\left[\frac{\log_3 24}{4};\frac{3}{4}\right]$, $(2;+\infty)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	3
Оба неравенства системы решены верно, но система решена неверно	2
Либо верно решено только одно из двух неравенств системы, либо в решениях двух неравенств содержатся арифметические ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	3

C4 Дан треугольник ABC со сторонами $AB=15$, $AC=9$ и $BC=12$. На стороне BC взята точка D, а на отрезке AD – точка O, причем $CD=4$ и $AO=3OD$. Окружность с центром O проходит через точку C. Найдите расстояние от точки C до точки пересечения этой окружности с прямой AB.

© МИОО, 2012 г.

Проведем через вершину A прямую, параллельную BC. Пусть T – точка ее пересечения с прямой CO, а M – точка пересечения AB и CT. Треугольник AOT подобен треугольнику DOC с коэффициентом $\frac{AO}{OD}=3$, поэтому $AT=3CD=12$.

Значит, треугольник AMT равен треугольнику BMC по стороне и двум прилежащим к ней углам. Тогда M – середина стороны AB. Следовательно, CM – медиана треугольника ABC.



Через вершину C проведем прямую, параллельную AB. Пусть Q – точка ее пересечения с прямой AO. Треугольник CDQ подобен треугольнику BDA с коэффициентом $\frac{CD}{DB}=\frac{1}{2}$, поэтому $CQ=\frac{1}{2}AB=7,5=AM$. Тогда треугольники AMO и QCO равны по стороне и двум прилежащим к ней углам. Поэтому O – середина CM.

Окружность с центром O проходит через точку C, и при этом $OM=OC$. Следовательно, OM – радиус этой окружности. Поскольку треугольник ABC прямоугольный, $CM=\frac{1}{2}AB=7,5$, а точка M — одна из точек пересечения прямой AB и окружности.

Пусть N – вторая точка пересечения окружности с прямой AB. Тогда угол CNM — вписанный и опирающийся на диаметр CM, так что $CN\perp AB$, то есть CN – высота треугольника ABC. Отсюда

$$CN=\frac{AC\cdot BC}{AB}=\frac{9\cdot 12}{15}=\frac{36}{5}=7,2.$$

Ответ: 7, 5 или 7, 2.

© МИОО, 2012 г.

Содержание критерия	Баллы
Обосновано получен верный ответ	3
Рассмотрена верная геометрическая конфигурация. Найдено одно верное значение искомой величины	2
Рассмотрена верная геометрическая конфигурация. Найдено одно значение искомой величины, неправильное из-за арифметической ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	3

© МИОО, 2012 г.

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

C1 а) Решите уравнение $\cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$.

б) Найдите корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\pi;\ \frac{5\pi}{2}\right]$.

Преобразуем уравнение:

$$\cos x = \cos 2x;$$

Значит, $x = 2x + 2\pi k$ или $x = -2x + 2\pi k$, где $k \in Z$.

В первом случае $x = 2\pi k$, во втором случае $x = \frac{2\pi k}{3}$, где $k \in \mathbb{Z}$.

Первая серия решений входит во вторую.



б) Отметим решения на тригонометрической окружности.

Отрезку $\left[\pi;\ \frac{5\pi}{2}\right]$ принадлежат корни $\frac{4\pi}{3}$ и 2π.

Ответ: а) $\frac{2\pi k}{3},\ k \in Z$; б) $\frac{4\pi}{3};\ 2\pi$.

Содержание критерия	Баллы
Уравнение решено верно, указаны все корни, принадлежащие интервалу	2
Уравнение решено верно, однако корни, принадлежащие интервалу, не указаны или указаны неверно	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© МИОО, 2012 г.

C2 Дана правильная четырехугольная пирамида $SABCD$. Боковое ребро $SA = \sqrt{5}$, сторона основания равна 2. Найдите расстояние от точки S до плоскости ADM, где M – середина ребра SC.

Построим сечение $ADMK$, K – середина ребра SB. Прямая BC параллельна AD, значит, искомое расстояние равно расстоянию от точки N до плоскости ADM. Пусть N – середина BC, P – середина AD. Рассмотрим сечение NSP.



$$SN = SP = \sqrt{SA^2 - AP^2} = \sqrt{5-1} = 2.$$

Значит, треугольник SNP равносторонний. Искомое расстояние равно расстоянию от S до PQ, где Q – середина SN. PQ – медиана и высота $\triangle SNP$. Поэтому искомое расстояние равно $SQ = \frac{1}{2}SN = 1$.

Ответ: 1.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Решение содержит обоснованный переход к планиметрической задаче, но получен неверный ответ или решение не закончено	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© МИОО, 2012 г.

C3 Решите систему

$$\begin{cases} 5^{3x-1} - 5^{3x+1} \le -72, \\ \log_{\frac{x}{3}}\left(3x^2 - 2x + 1\right) \ge 0. \end{cases}$$

1. Решим первое неравенство:

$$5^{3x-1}(1-25) \le -72;\ 5^{3x-1} \ge 3;\quad 3x - 1 \ge \log_5 3;\quad x \ge \frac{\log_5 3 + 1}{3}.$$

2. Решим второе неравенство $3x^2 - 2x + 1 > 0$ при всех x. При условиях $x > 0$ и $x \ne 3$ получаем неравенство

$$\left(\frac{x}{3} - 1\right)\left(3x^2 - 2x + 1 - 1\right) \ge 0;$$

$$x(x-3)(3x-2) \ge 0.$$

При указанных условиях получаем: $0 < x \le \frac{2}{3}$ или $x > 3$.

3. Решением системы является общая часть решений двух неравенств. $0 < \log_5 3 < 1$, поэтому $\frac{1}{3} < \frac{\log_5 3 + 1}{3} < \frac{2}{3}$. Следовательно,

$$\frac{\log_5 3 + 1}{3} \le x \le \frac{2}{3} \text{ или } x > 3.$$

Ответ: $\left[\frac{\log_5 15}{3}; \frac{2}{3}\right], (3; +\infty)$.

Содержание критерия	Баллы
Обосновано получен верный ответ	3
Оба неравенства системы решены верно, но система решена неверно	2
Либо верно решено только одно из двух неравенств системы, либо в решениях двух неравенств содержатся арифметические ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	3

© МИОО, 2012 г.

C4 Дан треугольник ABC со сторонами $AB = 25$, $AC = 7$ и $BC = 24$. На стороне BC взята точка D, а на отрезке AD – точка O, причем $CD = 8$ и $AO = 3OD$. Окружность с центром O проходит через точку C. Найдите расстояние от точки C до точки пересечения этой окружности с прямой AB.



Проведем через вершину A прямую, параллельную BC. Пусть T – точка ее пересечения с прямой CO, а M – точка пересечения AB и CT. Треугольник AOT подобен треугольнику DOC с коэффициентом $\frac{AO}{OD} = 3$, поэтому $AT = 3CD = 24$. Значит, треугольник AMT равен треугольнику BMC по стороне и двум прилежащим к ней углам. Тогда M – середина AB. Следовательно, CM – медиана треугольника ABC.

Через вершину C проведем прямую, параллельную AB. Пусть Q – точка ее пересечения с прямой AO. Треугольник CDQ подобен треугольнику BDA с коэффициентом $\frac{CD}{DB} = \frac{1}{2}$, поэтому $CQ = \frac{1}{2}AB = 12,5 = AM$. Тогда треугольники AMO и QCO равны по стороне и двум прилежащим к ней углам. Поэтому O – середина CM.

Окружность с центром O проходит через точку C, и при этом $OM = OC$. Следовательно, OM – радиус этой окружности. Поскольку треугольник ABC прямоугольный, $CM = \frac{1}{2}AB = 12,5$, а точка M — одна из точек пересечения прямой AB и окружности.

Пусть N – вторая точка пересечения окружности с прямой AB. Тогда угол CNM — вписанный и опирающийся на диаметр CM, так что $CN \perp AB$, то есть CN – высота треугольника ABC. Отсюда

$$CN = \frac{AC \cdot BC}{AB} = \frac{24 \cdot 7}{25} = 6,72.$$

Ответ: $12,5$ или $6,72$.

© МИОО, 2012 г.

Содержание критерия.	**Баллы.**
Обосновано получен верный ответ.	3
Рассмотрена верная геометрическая конфигурация. Найдено одно верное значение искомой величины.	2.
Рассмотрена верная геометрическая конфигурация. Найдено одно значение искомой величины, неправильное из-за арифметической ошибки.	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.	0
Максимальный балл.	3.

© МИОО, 2012 г.

Ответы к заданиям с кратким ответом

№ задания	Ответ
B1	7040
B2	650000
B3	40,5
B4	157900
B5	-17
B6	111
B7	3

№ задания	Ответ
B8	-0,25
B9	19
B10	0,995
B11	32
B12	4
B13	72
B14	-5

© МИОО, 2012 г.

Ответы к заданиям с кратким ответом

№ задания	Ответ
B1	8375
B2	13
B3	13,5
B4	172000
B5	-4
B6	174
B7	-5

№ задания	Ответ
B8	-0,25
B9	22
B10	0,99
B11	16
B12	2
B13	51
B14	-7

© МИОО, 2012 г.